

# مسارات اتخاذ القرارات بشأن الأعراض في مراكز الرعاية والتعليم المبكر ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية


إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس

آخر تحديث: 8/15/2022

مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع *الأطفال* الذين يعانون من أعراض

# مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع الأطفال الذين يعانون من أعراض قبل دخول<sup>1</sup> مؤسسة تعليمية، بصرف النظر عن حالة التطعيم

<sup>1</sup> إذا شعر الطفل بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيدًا جسديًا عن يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.




<sup>1</sup> تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى  $\leq 100.4$  درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير معتاد)؛ القيء أو أي حالة إسهال جديدة. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يُنصح بأن يخضع الطفل لتقييم مقدم رعاية طبية.

<sup>2</sup> يشمل اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي اختبار تضخيم الحمض النووي، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (اختبار المسحة)، أو اختبار المستضدات السريع (بما في ذلك الاختبارات المنزلية أو التي لا تستلزم وصفة طبية). تعتبر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (اختبار المسحة) الأدق، ولكن يمكن استخدامها أو استخدام اختبار المستضدات السريع.

مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع **الموظفين** الذين يعانون من أعراض

# مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض قبل دخول<sup>1</sup> مؤسسة تعليمية بصرف النظر عن حالة التطعيم

<sup>1</sup> إذا شعر الموظف بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيداً جسدياً عن من يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.



<sup>1</sup> تشمل الأعراض المرتبطة بعدوى كوفيد-19 المحتملة لدى البالغين ما يلي: حمى  $\leq 100.4$  درجة فهرنهايت أو الشعور بالحمى (قشعريرة وتعرق)؛ السعال؛ ضيق التنفس؛ فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم؛ التعب؛ الرشح أو احتقان الأنف؛ آلام العضلات أو الجسم؛ الصداع؛ التهاب الحلق؛ الغثيان أو القيء؛ الإسهال. إذا لم تكن الأعراض ضمن ما سبق ذكره، ولكن لا يزال هناك قلق، يُنصح بإجراء تقييم إضافي لدى مقدم رعاية طبية.

<sup>2</sup> يشمل اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي اختبار تضخيم الحمض النووي، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (اختبار المسحة)، أو اختبار المستضدات السريع (بما في ذلك الاختبارات التي لا تستلزم وصفة طبية أو المنزلية). تعتبر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (اختبار المسحة) الأدق، ولكن يمكن استخدامها أو استخدام اختبار المستضدات السريع.

مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع المخالطين (طفل/موظف أو طالب/عامل) لشخص يُحتمل أن يكون مصابًا

## مسارات اتخاذ القرارات في التعامل مع المخالطين لشخص يُحتمل أن يكون مصاباً في مؤسسة تعليمية

الشخص الذي يُحتمل أن يكون مصاباً هو من يعاني من عرض واحد على الأقل من أعراض فيروس كوفيد-19<sup>1</sup>. في أماكن التعليم العام ومراكز التعليم، فإن المخالطين من قرب للفرد المحتمل إصابته هم أولئك الذين اشتركوا معه في مجال الهواء الداخلي نفسه أو كانوا على بعد 6 أقدام من شخص مصاب بكوفيد-19 لمدة 15 دقيقة أو أكثر في خلال 24 ساعة في مرحلة العدوى<sup>2</sup>.

لا يحتاج المخالطون الذين لا تظهر عليهم أعراض إلى الحجر الصحي، ولكن يُتطلب منهم:

- (1) مراقبة الأعراض لمدة 10 أيام بعد آخر تعرض للفيروس.
- (2) ارتداء كمامة عالية الوقاية عند الاشتراك مع الآخرين في مساحات مغلقة، إلا عند الأكل والشرب، لمدة 10 أيام بعد آخر تاريخ للتعرض، وهذا لمن يبلغ عمرهم سنتين أو أكثر.\*
- (3) إجراء اختبار كوفيد-19 مصحح به من إدارة الغذاء والدواء (مثل اختبار المسحة أو المستضدات، بما في ذلك الاختبارات المنزلية) في غضون 3 - 5 أيام منذ تاريخ آخر تعرض.\*\*

\* يمكن للطلاب/الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين أو أكثر ممن لديهم إعفاء من ارتداء الكمامة ارتداء واقي وجه له حاجب من الجزء السفلي أو الخضوع للاختبار مرة بعد 3-5 أيام ومرة بعد 6-9 أيام إذا أرادوا لبقاء في الموقع. يجب ألا يرتدي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين كمامة. يُرجى الاطلاع على خطة إدارة التعرض للمدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية أو خطة إدارة التعرض لأماكن التعليم والرعاية المبكرة لمزيد من التفاصيل.

\*\* إذا كنت قد أصبت بكوفيد-19 في آخر 90 يوماً، فلن تحتاج إلى إجراء اختبار إلا إذا ظهرت عليك الأعراض.

إذا كنت على مسافة 6 أقدام من شخص مصاب لمدة 15 دقيقة أو أكثر في فترة 24 ساعة وفق تعريف الاتصال الوثيق في الفصول الدراسية أو الأماكن ذات الحجم المماثل، يجب إخطار جميع الأفراد الآخرين الذين تقاسموا نفس الحيز الداخلي مع الشخص المصاب لمدة 15 دقيقة أو أكثر في فترة 24 ساعة بأنهم يُحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للفيروس، ويُنصح بشدة باتباع الإرشادات المذكورة أعلاه لرصد الأعراض وارتداء الكمامات (لمن يبلغ عمرهم سنتين أو أكثر) والخضوع للاختبار.

تتأكد المنشأة من أن المخالط قد تعرض لفيروس كوفيد-19.

يُخطَر مخالطو الشخص الذي يُحتمل أن يكون مصاباً بأنهم قد يكونوا تعرضوا للفيروس.

يجوز للمخالطين أن يبقوا في المنشأة في أثناء انتظار تأكيد المخالطة.<sup>3</sup>

تتأكد المنشأة من أن المخالط لم يتعرض للفيروس أو لا يُقدّم ما يؤكد المخالطة.  
لا يلزم اتخاذ إجراء في هذه الحالة.

<sup>1</sup> الأعراض التي تدل على احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19 تختلف بين الأطفال والبالغين، انظر الصفحة 3 للاطلاع على الأعراض لدى الأطفال والصفحة 5 للاطلاع على الأعراض لدى البالغين.

<sup>2</sup> توجد طرق مختلفة لتحديد المخالطين في مراكز الرعاية والتعليم المبكر ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي.  
<sup>3</sup> تتأكد حالة تعرض المخالط لفرد يُحتمل أن يكون مصاباً بالفيروس إذا تلقى الموقع إشعاراً بأن نتيجة اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي للفرد المُشتبه في إصابته ظهرت إيجابية أو إذا تلقى تشخيصاً بفيروس كوفيد-19 من مقدم رعاية طبية.