

**វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្ត សម្រាប់ការពិនិត្យតាមដានរោគសញ្ញា នៅ  
មណ្ឌលថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច និងសាលារៀនកម្រិត TK-12**

*នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 8/15/2022*

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ *កុមារ* ដែលមានរោគសញ្ញា



វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ *បុគ្គលិក* ដែលមានលោកសញ្ជា

# វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្ត សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញា មុនពេលចូល<sup>1</sup> ទៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ ដោយមិនគិតអំពីស្ថានភាពនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការ

ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនស្រួលខ្លួននៅកន្លែងការងារ សូមដាក់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែក (យកល្អដាក់បុគ្គលិកនៅទីធ្លាខាងក្រៅអគារ រក្សាគម្លាតរាងកាយពីអ្នកមើលថែផ្សេងទៀត) ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តដូចខាងក្រោម។

ការត្រួតពិនិត្យកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញា 1 ឬច្រើនជាងនេះដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19<sup>1</sup>

ការត្រួតពិនិត្យកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញា ហើយដែលមិនទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19<sup>1</sup>

បុគ្គលិកត្រូវបញ្ជូនឱ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការវាយតម្លៃបន្ថែមទៀត និងការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតមាន។

ស្ថាប័នសម្រេចចិត្តក្នុងការកំណត់ថា តើបុគ្គលិកត្រូវតែត្រូវបានលើកលែងតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងជំងឺឬទេ។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់បុគ្គលិកធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តតាមពិធីការសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងនោះ បុគ្គលិកត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។

អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកមិនមានរោគសញ្ញាដែលស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទេ។

មិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទេ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកមានរោគសញ្ញាដែលស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19<sup>1</sup>

បុគ្គលិកទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19<sup>2</sup>

បុគ្គលិកទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19<sup>2</sup>

បុគ្គលិកត្រូវនៅផ្ទះដោយអនុវត្តតាម សេចក្តីណែនាំរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

បុគ្គលិកត្រូវនៅផ្ទះរហូតដល់លែងមានគ្រុនក្តៅ ដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅសម្រាប់រយៈពេល 24 ម៉ោង និងរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ស្បើយឡើង។

បុគ្គលិកត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនៃការខ្លួនដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។

បុគ្គលិកបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ

បុគ្គលិកមិនបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ


<sup>1</sup> រោគសញ្ញានានាដែលទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ចំពោះមនុស្សពេញវ័យមានដូចជា៖ គ្រុនក្តៅលើសពីប្រាំបួន (≥) 100.4° ឬមានអារម្មណ៍ដូចគ្រុនក្តៅ (គ្រុនរងា បែកញើស) ក្អក ដកដង្ហើមខ្លីៗ លែងដឹងរសជាតិឬក្លិនថ្មីៗ អស់កម្លាំង ហឿនដំបៅឬក្លិនច្រមុះ ឈឺសាច់ដុំឬឈឺរាងកាយ ឈឺក្បាល ឈឺបំពង់ក ចង្កោរចងក្អាតឬក្អក រាករស។ ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងនេះទេ ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភ មានការណែនាំឱ្យទទួលការវាយតម្លៃបន្ថែមដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

<sup>2</sup> ការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកមេរោគ COVID-19 រួមមានទាំងការធ្វើតេស្តពង្រីកអាស៊ីដនុយក្លេអ៊ិច (NAATs) ដូចជាការធ្វើតេស្តរកទម្រង់មេរោគ (PCR) ឬការធ្វើតេស្តរកសារធាតុដែលបញ្ចូលក្នុងខ្លួនដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំ (antigen) បែបរហ័ស (រួមទាំងតេស្តដែលអាចទិញបានដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជា ឬតេស្តនៅផ្ទះផងដែរ)។ ការធ្វើតេស្តប្រភេទ PCR ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទតេស្តសម្រាប់ពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 ដែលផ្តល់លទ្ធផលច្បាស់លាស់បំផុត ប៉ុន្តែអាចនឹងប្រើប្រាស់តេស្តប្រភេទ PCR ក៏បាន ឬក៏តេស្តប្រភេទ antigen បែបរហ័ស ក៏បាន។

**វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនង (កុមារ/សិស្ស  
ឬបុគ្គលិក/អ្នកធ្វើការ) ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលទំនងជាអាចឆ្លងមេរោគ**

# វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្ត សម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបុគ្គលដែលទំនងជាអាចឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ

**បុគ្គលដែលទំនងជាអាចឆ្លងមេរោគ** គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាលើសពីប្លូស្ទី (≥) 1 ហើយដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ នៅតាមទីតាំងសាលារៀនកម្រិត TK-12 ព្រមទាំងទីតាំងថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) **អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលទំនងជាអាចឆ្លងមេរោគ** គឺជាបុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅទីលំហបរិយាកាសខាងក្នុងអគាររួមគ្នា ឬស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតពីបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19 បានរយៈពេលសរុបចាប់ពី 15 នាទីឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង ខណៈពេលដែលពួកគេអាចចម្លងមេរោគបន្តបាន។



បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហើយដែលមិនមានរោគសញ្ញា មិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយ ប៉ុន្តែតម្រូវចាំបាច់ឱ្យ៖

- (1) តាមដានចំពោះរោគសញ្ញាសម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគចុងក្រោយ។
- (2) ប្រសិនបើមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ ពាក់ម៉ាស់ដែលមានកម្រិតការពារល្អណាស់ពេលនៅជិតអ្នកដទៃខណៈនៅក្នុងអគារ លើកលែងតែពេលកំពុងបរិភោគអាហារឬភេសជ្ជៈ សម្រាប់រយៈពេល 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ។\*
- (3) ធ្វើតេស្តដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ (FDA) (ឧទាហរណ៍ ការធ្វើតេស្តរកទម្រង់មេរោគ [PCR] ឬ ការធ្វើតេស្តរកសារធាតុដែលបញ្ចូលក្នុងខ្លួនដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំ [Antigen] រួមទាំងការធ្វើតេស្តនៅផ្ទះផងដែរ) ក្នុងអំឡុងពេល 3 ទៅ 5 ថ្ងៃចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ។ \*\*

**\*សិស្ស/កុមារ** អាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលមានការលើកលែងចំពោះការពាក់ម៉ាស់ អាចពាក់វ៉ាន់មុខដែលមានក្រណាត់នៅតែម្តងក្រោម ឬត្រូវតែធ្វើតេស្តចំនួនម្តង នៅចន្លោះថ្ងៃទី 3 និងទី 5 ហើយម្តងទៀត នៅចន្លោះថ្ងៃទី 6 និងទី 9 ដើម្បីបន្តស្ថិតនៅទីតាំងបាន។ កុមារដែលមានអាយុក្រោម 2 ឆ្នាំមិនគួរពាក់ម៉ាស់ទេ។ សូមយោងទៅលើ ផែនការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគសម្រាប់សាលារៀនកម្រិត TK-12 ឬ ផែនការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគសម្រាប់ទីតាំងថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត។

**\*\*ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានជំងឺ COVID-19** ក្នុងអំឡុងពេល 90 ថ្ងៃកន្លងមកនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តទេ លុះត្រាតែអ្នកកើតមានរោគសញ្ញា។

ប្រសិនបើប្រើប្រាស់និយមន័យដែលថា បានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតពីអ្នកឆ្លងមេរោគ បានរយៈពេលចាប់ពី 15 នាទីឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឬទីតាំងដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានេះ បុគ្គលផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅទីលំហបរិយាកាសខាងក្នុងអគាររួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងមេរោគ បានរយៈពេលចាប់ពី 15 នាទី ឡើងទៅ ក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង ត្រូវតែបានជូនដំណឹងថា ពួកគេទំនងជាបានប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ ហើយមានការណែនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឱ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំខាងលើចំពោះការតាមដានរោគសញ្ញា ការពាក់ម៉ាស់ (ប្រសិនបើមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ) និងការធ្វើតេស្តរកមេរោគ។

1 **រោគសញ្ញា** ដែលស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃជំងឺ COVID-19 មានភាពខុសគ្នាចំពោះកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ សូមមើលស្តាយលេខ 3 សម្រាប់លក្ខខណ្ឌរបស់កុមារ និងស្តាយលេខ 5 សម្រាប់លក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សពេញវ័យ។  
 2 មានមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងទីតាំងថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) សាលារៀនកម្រិត TK-12 និងស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់ (IHE)។ សូមយោងទៅលើផែនការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគដែលពាក់ព័ន្ធនៅទីតាំងទាំងនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ **ទីតាំងថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE)** ឬ **សាលារៀនកម្រិត TK-12** ឬ **ស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់ (IHE)**។  
 3 **ការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់** សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកុមារដែលទំនងជាអាចមានឆ្លងមេរោគ ប្រសិនបើទីតាំងនោះទទួលបានដំណឹងថាកុមារដែលទំនងជាអាចមានឆ្លងមេរោគនោះ បានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តក្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬត្រូវបានការព្រឹត្តិការណ៍នៃជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។