


保育・幼児教育センターと幼稚園・小中高等学校での症状に 関する判断経路

ロサンゼルス郡公衆衛生局
更新: 8/15/2022

症状を持つ *子供* に対する判断経路

ワクチン接種の有無に関わらず、教育施設に入る¹前に症状を持つ子供に対する判断経路

¹子供が施設内で症状を出した場合、その子供を隔離場所（他の参加者から離れた場所、理想的には屋外）に連れていき、下記に説明される判断経路に従いましょう。




¹小児におけるCOVID-19感染の可能性と一致する症状は次を含みます：100.4°F以上の発熱、新しい咳（通常とは異なる）、嘔吐、または新たに発症した下痢。子供の症状がCOVID-19感染症の疑いのあるものと一致しないものの懸念がある場合、医療従事者から診断を受けることが推奨されます。

²COVID-19 診断ウイルス検査には、PCR などの核酸増幅検査、または迅速抗原検査（市販のものや自宅で行える検査キットなど）が含まれます。PCR 検査は COVID-19 を検出する最も正確な検査と考えられていますが、PCR 検査または迅速抗原検査のどちらを受けても構いません。

症状を持つ従業員に対する判断経路

ワクチン接種の有無に関わらず、教育施設に入る¹前に症状を持つ従業員に対する判断経路

¹従業員が施設内で症状を出した場合、その従業員を隔離場所（他の参加者から離れた場所、理想的には屋外）に連れていき、下記に説明される判断経路に従いましょう。




¹成人のCOVID-19である疑いがある症状は次を含みます：100.4°F以上の発熱（悪寒、発汗）、咳、息切れ、新しい味や匂いの損失、疲労、鼻水や鼻づまり、筋肉痛や体の痛み、頭痛、のどの痛み、吐き気や嘔吐、下痢。このリストにない症状があり、懸念がある場合は医療従事者による追加の診断が推奨されます。

²COVID-19 診断ウイルス検査には、PCR などの核酸増幅検査、または迅速抗原検査（市販のものや自宅で行える検査キットなど）が含まれます。PCR 検査は COVID-19 を検出する最も正確な検査と考えられていますが、PCR 検査または迅速抗原検査のどちらを受けても構いません。

感染の可能性がある人の接触者（子供・学生、または従業員・スタッフ）に対する判断経路

教育施設で感染した可能性のある人と接触した人に対する判断経路

感染の可能性のある人とは、COVID-19¹の疑いがある症状と一致する症状が一つ以上みられる人を意味します。TK-12およびECE施設における**感染の可能性のある人の濃厚接触者**とは、感染可能期間中にCOVID-19感染者と同じ屋内空間を共有した人、または6フィート以内の距離で24時間以内に合計15分以上一緒にいた人を指します。²



無症状の濃厚接触者は待機する必要はありませんが、以下が義務付けられます。

- (1) 最終接触日から10日間、症状を監視する。
- (2) 2歳以上の場合は、飲食する場合を除き、最終接触日から10日間、屋内で周囲に他の人がいる場合は、保護機能の高いマスクを着用する。^{*}
- (3) 最終接触日から3～5日以内に、FDA承認のCOVID-19ウイルス検査（例：PCRまたは自宅でできる検査キットを含む抗原検査）を行う。^{**}

^{*}マスクを免除されている2歳以上の生徒/子供は、下部にドレープが付いたフェイスシールドを着用するか、施設に留まるために3～5日目に1回、6～9日目に1回、検査を受ける必要があります。2歳未満のお子様はマスクを着用しないでください。詳細は、TK-12 感染管理計画またはECE 感染管理計画を参照してください。

^{**}過去90日間にCOVID-19に感染した場合は、症状が出ない限り検査を行う必要はありません。

教室または同規模の施設環境における濃厚接触者を特定するために「24時間以内に感染者から6フィート以内の距離に15分以上いた場合」という定義を適用する場合、24時間以内に感染者と同じ屋内空間を15分以上共有した他のすべての人に、濃厚接触者には該当しないが、潜在的な曝露があったこと、及び症状の監視、マスク着用（2歳以上の場合）、および検査に関する上記のガイダンスに従うことが強く推奨されることを通知する。

¹ 子供と成人のCOVID-19の基準となる**症状**は異なります。子供向けの基準はスライド3、成人向けの基準はスライド5をご覧ください。

² ECE、TK-12、およびIHE施設において濃厚接触者を特定する方法には、さまざまなアプローチがあります。詳細については、施設に該当する感染管理計画: [ECE](#), [TK-12](#), [IHE](#)を参照してください。

³ 感染した可能性のある子供がCOVID-19ウイルス感染症検査で陽性と診断された、または医療従事者からCOVID-19感染症と診断されたと施設が通知を受けた場合、感染した可能性のある子供との濃厚接触者への**曝露が確認**されたことを意味します。