



COVID-19 疫苗概況

疫苗可預防 COVID-19 的 最壞結果。

- COVID-19 疫苗可降低您因 COVID-19 重病、住院或死亡的風險。疫苗還能降低感染長期 COVID 的風險。
- Pfizer、Moderna 和 Novavax 的 COVID-19 疫苗已經過**更新**，可以抵禦最新毒株。
- （以前接種或感染所得的）免疫防護能力可能隨著時間的推移而減弱，而更新後的疫苗可以增強這種免疫防護能力。



6 個月及以上的兒童應接種更新的 COVID-19 疫苗。



- **6 個月至 4 歲的兒童**應向醫療服務提供者諮詢他們需要接種的疫苗劑量。這取決於他們前幾年接種的劑量。
- **所有 5 歲及以上的人群**都應接種一劑最新的 COVID-19 疫苗。
- **免疫力低下人群**可能需要注射額外劑量的更新疫苗。請向您的醫生諮詢最適合您的接種時間安排。
- 如果您是**65 歲及以上的老年人、重症高危人群或從未接種過 COVID-19 疫苗的人群**，接種更新版 COVID-19 疫苗尤為重要。
- 即使是**孕婦、哺乳期婦女或曾經感染過 COVID-19 的人群**也應該接種更新版疫苗。
- 欲瞭解更多信息，請訪問 [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine)。



COVID-19 疫苗概況

疫苗接種地點

如果您有保險，請聯繫您的醫療服務提供者安排疫苗接種預約。自 2024 年 10 月起，無保險者可在特定地點免費接種疫苗。

請注意：未成年人接種疫苗需要父母或法定監護人的同意。

如需查找您附近的接種點，請訪問 ph.lacounty.gov/vaccines，或撥打 **1-833-540-0473** 或 **2-1-1**。

您可以撥打 **1-833-540-0473**

，或訪問 VaccinateLACounty.com，點擊「居家疫苗」(In-Home Vaccines)，申請居家疫苗接種。



嚴重的副作用較為罕見。

- 常見的副作用包括接種部位疼痛、腫脹和發紅、肌肉或關節疼痛、淋巴結腫大、發燒、發冷、頭痛和疲倦。幼兒的副作用還包括哭鬧、煩躁、困倦和食慾不振。
- 副作用是免疫系統正在**建立防護能力**的信號。副作用可能會影響您進行一些日常活動，但在接種後一兩天內就會消失。
- 嚴重的副作用較為罕見。



COVID-19 疫苗安全有效。

- 您不會因為接種疫苗而感染 COVID-19。所有疫苗都不含導致 COVID-19 的病毒。
- 這些疫苗已在數萬人（包括有色人種、老年人和患有疾病的人群）身上進行過測試，結果表明疫苗是**安全有效**的。
- 自 2020 年 12 月**以來**，已有數億人安全接種了 COVID-19 疫苗。
- COVID-19 疫苗仍在接受美國歷史上最**密集的安全監測**。
- 沒有證據表明 COVID-19 疫苗會導致生育問題。COVID-19 疫苗對孕婦是安全的，也是產科專家推薦使用的疫苗。

